

M.W.M de Waal, A.M. van Hemert

Correspondentie:
M.W.M. de Waal
Leids Universitair Medisch Centrum
Public Health en Eerstelijngeneeskunde
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Tabel

Normscores voor Nederlandse respondenten voor de Lichamelijke Klachten Vragenlijst (51 items) in de algemene bevolking en in een populatie die de huisarts consulteerde (SOUL project, 25 tot 69 jaar).

	n	Gemiddelde	SD*	Laag (p10)*	Licht (p25)*	Mediaan (p50)*	Matig (p75)*	Hoog (p90)*
Algemene bevolking								
Geen angst/depress								
- Mannen	637	1,6	2,5	0	0	1	2	5
- Vrouwen	859	3,0	3,7	0	0	2	4	8
Wel angst/depressie								
- Mannen	118	7,6	6,0	1	3	6	11	15
- Vrouwen	216	9,4	6,4	2	4	9	13	17
Huisartsconsultatie								
Geen angst/depress								
- Mannen	241	2,7	3,2	0	0	1	4	8
- Vrouwen	485	4,1	4,4	0	0	3	6	10
Wel angst/depressie								
- Mannen	64	8,9	6,4	2	4	8	13	16
- Vrouwen	149	10,8	6,9	3	5	10	15	21

* SD=Standaard deviatie; p10, p25, p50, p75, p90=percentiel scores (respectievelijk 10%, 25%, 50%, 75% en 90% scoort onder deze score); angst/depressie bij HADS-totaalscore 15 of hoger

Crombach alpha: 0,88³

SOUL-project (Somatisatie Onderzoek Universiteit Leiden) onderzoekt met subsidie van NWO-CZ de epidemiologie en behandeling van somatoforme stoornissen en de co-morbiditeit met angst en depressie in de huisartspraktijk.

Referenties

1. Van Hemert AM, De Waal MWM, van Rood YR. Meetinstrumenten bij somatoforme stoornissen. Tijdschrift voor Psychiatrie 2004; 46: 693-6.
2. De Waal MWM, Arnold IA, Spinhoven Ph, Eekhof JAH, Van Hemert AM. The reporting of specific physical symptoms for mental distress in general practice. J Psychosom Res 2005; 59: 89-95.
3. De Waal MWM, Arnold IA, Spinhoven Ph, Eekhof JAH, Assendelft WJJ, Van Hemert AM. The role of comorbidity in the detection of psychiatric disorders with checklists for mental and physical symptoms in primary care. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2009; 44: 78-85.